




むし歯になっちゃう…

むし歯は早期発見して早期に治療すれば痛みも治療費も少なくて済みます。むし歯が進行し神経をとらなければいけない場合や、歯根の先に炎症が起き、はれたりすると治療が何ヶ月もかかり、放置すれば、一時的に痛みが消失しても必ず再発します。


1年に1回は定期健診をしましょう!

むし歯の進行と治療

C1



痛みを伴う自覚症状なし
エナメル質のみのむし歯で、黒っぽく変色して見えるか、あるいは小さな穴があいている程度です。




【充填法】
むし歯の部分を削り、消毒し、そこに人工の物をつめてふさぎます。


C2



冷たい水や風が歯にしみる
象牙質にまで進行したむし歯で、表面の穴は小さくても、内部は大きく広く深くなっている場合もあります。




型をとります。




型をもとに作製したものをつめる。

C3




熱いものもしみズキズキ
歯髄（神経）にまで達したむし歯です。




【抜髓法】
病気になった歯髄組織を取りのぞきます。

治療はかなりの回数がかかる場合があります。ていねいに治療しておけば歯髄はなくなってもまだ十分に歯としての機能をはたします。

C4



歯の根だけ残る末期症状
根の部分しか残っていないので、薬をつめたりふさいだりという治療もできず、抜かざるを得ません。ほっておくと感染が全身に及ぶことがあります。



【感染根管治療法】
感染部分をきれいに取り除き消毒します。

根管の中に人工的な物（薬剤）をつめます。

単冠



抜歯

ブリッジ
入れ歯



歯科医師・歯科衛生士は
あなたの強い味方!
お口の健康を守る
プロフェッショナル!

広島市歯科医療福祉対策協議会

広島市中区富士見町11番9号 広島市歯科医師会事務局内 TEL(082)244-2662